

# **AVISOS AGRÍCOLAS**

## **ESTAÇÃO DE AVISOS DO DOURO**

### **MÍLDIO**

A precipitação registada nos últimos dias, proporcionou novas condições para a ocorrência de infeções primárias de míldio.

Perante a instabilidade meteorológica e dado que nos encontramos numa fase de grande sensibilidade da videira à doença, aconselhamos:

- ✓ Nas vinhas que estão desprotegidas, a realização **de um tratamento contra o míldio antes do dia 19 ou 20 de maio**. O tratamento deverá ser posicionado o mais próximo possível desta data, para que, caso surjam as manchas primárias, o fungicida se encontre em fase de plena atividade, utilizando **um fungicida sistémico que possua ação curativa e anti-esporulante**;
- ✓ Nas vinhas que se encontravam tratadas (protegida) à altura das chuvas, ou que, entretanto, foram tratadas, aconselhamos a renovar o tratamento. Lembramos que nesta fase a persistência de ação dos tratamentos é de cerca de 8 a 10 dias.

### **TRACA DA UVA**

De uma forma geral considera-se que não é necessário efetuar qualquer tratamento.

Nas parcelas em que a praga tem causado prejuízos nos últimos anos, o Sr. Viticultor deverá efetuar a Estimativa do Risco, contando o número de ninhos existentes em 100 cachos. Se este número for de 100 a 200, deverá contactar a Estação de Avisos.

#### **Nota importante**

Para contrariar o desenvolvimento das doenças e aumentar a eficácia dos tratamentos, é muito importante que a despampa esteja realizada e que a vegetação seja corretamente orientada.

A desponta deverá ser ligeira e atrasada o mais possível, para não estimular a emissão de netas.

Estas operações culturais promovem o arejamento do interior da sebe e facilitam a penetração da calda fungicida.

### **OÍDIO**

Nas vinhas que à data do tratamento, possuam já desenvolvimento vegetativo adiantado (Botões Florais Separados / Floração), deverá ser adicionado à calda **um fungicida anti-oídio sistémico**.

Nas vinhas das zonas altas, com menor desenvolvimento vegetativo, aconselhamos a aplicação de **enxofre molhável** juntamente com o produto anti-míldio.

A enxofra deverá ser realizada com **polvilhador** ou **torpilha**, para que o produto fique depositado sob a forma de uma fina camada à **superfície das folhas da videira**, evitando a sua escorrência e acumulação no solo.

### **PODRIDÃO NEGRA (Black Rot)**

Continua a verificar-se o aparecimento de manchas nas folhas em algumas vinhas da Região.

Assim, se encontrou alguma mancha ou se se trata de uma vinha com historial desta doença, que em anos anteriores tenham manifestado sintomas, deverá existir o cuidado de selecionar os fungicidas que possuam também eficácia contra o Black Rot.

Os fungicidas homologados para a cultura da Vinha, devem ser consultados no site da DGAV: **SIFITO-Sistema de Gestão das Autorizações de Produtos Fitofarmacêuticos** - Sifito (<https://sifito.dgav.pt/>).